

**Lisa 2. Isikukaitsevahendite (IKV) kasutamise miinimum põhimõtted COVID-19 positiivse või nakkusohtliku patsiendi käsitlemisel**

IKV	Lähikontakt COVID-19 (C19) kahtlusega patsiendiga	AGP teostamine C19 kahtlusega või kinnitunud juhtudel sh hambaravi	COVID-osakond; COVID-IRO; COVID-EMO
Pritsmekindel kaitsekittel ¹	+	+	+
Kilepõll ²	-	-	+
Kätised ²	-	-	+
Kindad ²	+	+	+
FFP2 respiraator ^{3,4} koos kaitseprillidega VÕI kirurgiline mask koos visiiriga	+	-	+
FFP3 respiraator ^{3,4} koos kaitseprillidega/visiir	-	+	AGP

¹pritsmekindla kitli puudumisel tuleb kasutada ühekordset kilepõlle tavalise kaitsekitli peal.

²COVID-osakondades, COVID-IROs ja COVID-EMOs vahetatakse patsiendiga kontaktijärgselt kilepõll, kindad ja kätised. Respiraator, kaitsekittel jäävad samaks osakonnast lahkumiseni.

³FFP3 respiraatori puudumisel kasutada FFP2 respiraatorit. Respiraatorite puudumisel kasutada kirurgilist maski koos visiiriga!

⁴Kaitseprillid/visiirid desinfitseeritakse. Muud kasutusel olevad isikukaitsevahendid on ühekordseks kasutamiseks.